

Vaccinarea cu doza de rapel cu un vaccin ARNm (ARN mesager) (Pfizer/BioNTech, Moderna)

Vaccinurile ARNm oferă protecție eficientă împotriva îmbolnăvirii grave și spitalizării din cauza COVID-19. Studiile efectuate au arătat faptul că în cazul persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani imunitatea conferită de vaccin poate scăde în timp. În cazul acestor persoane administrarea dozei de rapel este recomandată la 6 luni de la data administrării ultimului vaccin anti-Covid-19. Până în prezent este încă neclar, dacă protecția vaccinului împotriva bolilor grave scade în cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 65 de ani și în cazul noilor variante de virus. Totuși, trebuie menționat faptul, că protecția împotriva îmbolnăvirii ușoare și împotriva virusului transmis scade în timp în cazul tuturor persoanelor. Această scădere are în loc mai repede sau mai lent, în funcție de variantă. Astfel, administrarea dozei de rapel este recomandată în cazul tuturor persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani.

Care este scopul dozei de rapel?

Doza de rapel reamintește sistemul imunitar de existența agentului patogen. Imunitatea Protecția crescută conferită de vaccin este restabilită și prelungită.

Când este recomandată administrarea dozei de rapel?

În scopul beneficierii de o protecție cât mai bună împotriva îmbolnăvirii cu Covid-19 în formă severă și cu spitalizare administrarea dozei de rapel este recomandată tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani.

În special:

- persoanelor care au împlinit vârsta de 75 de ani;
- persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, care suferă de boli cronice și sunt expuse la risc maxim¹ în cazul îmbolnăvirii cu Covid-19, în formă gravă;
- rezidenților și persoanelor din cămine de bătrâni, din aziluri de bătrâni și din centrele de îngrijire de zi a persoanelor în vârstă.

În cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 65 de ani doza de rapel poate contribui la creșterea protecției împotriva infecțiilor și a îmbolnăvirii în formă ușoară, împotriva consecințelor acestora (de exemplu, efectele pe termen lung ale Covid-19, incapacitate de muncă), precum și la reducerea temporară a vitezei de răspândire a virusului. Astfel, doza de rapel este recomandată și tuturor persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 - 64 de ani.

În special:

- persoanelor sub vârsta de 64 de ani, care suferă de boli cronice și care sunt foarte expuse riscului maxim¹ de contactare a virusului Covid-19 în formă gravă.
- rezidenților și persoanelor cu vârsta sub 65 de ani din căminele de bătrâni, din azilurile de bătrâni și din centrele de zi pentru persoane vârstnice.
- personalului sanitar cu contact direct cu pacienții și personalului de deservire a persoanelor cu risc special.

Administrarea dozei de rapel este recomandată și în cazul femeilor însărcinate, însă doar începând cu trimestrul 2 de sarcină și femeilor care alăptează.

Când trebuie administrată doza de rapel?

Administrarea dozei de rapel este recomandată în termen de 4 luni de la data imunizării de bază complete cu un vaccin ARNm.

Imunizarea de bază completă apare după

- administrarea a două doze de vaccin ARNm; sau
- după o infecție confirmată cu coronavirus + o doză de vaccin ARNm la un interval de cel puțin 4 săptămâni (indiferent de ordinea de administrare).

În cazul în care infectarea cu coronavirus a fost confirmată după o imunizare de bază completă cu un vaccin ARNm, sunt aplicabile următoarele:

- în cazul în care infectarea are loc în interval de 4 luni de la imunizarea de bază este recomandată administrarea dozei rapel, după 4 luni de la infectare.
- în cazul în care infectarea a survenit într-un interval mai lung de 4 luni de la imunizarea de bază, în mod obișnuit, administrarea dozei de rapel nu este necesară.

Ce vaccin și ce doză este administrat(ă) se folosește pentru administrarea rapelului?

În principiu, pentru administrarea dozei de rapel trebuie folosit același vaccin, ca pentru vaccinarea de bază. În cazul în care acest vaccin n este disponibil, poate fi folosit un alt vaccin pe bază de ARNm. În cazul în care pentru imunizarea de bază au fost utilizate vaccinuri pe bază de ARNm diferite, doza de rapel poate fi administrată cu oricare dintre cele două vaccinuri.

La fel ca în cazul imunizării de bază, în cazul persoanelor sub 30 de ani este recomandat, ca doza de rapel să fie efectuată cu vaccinul Pfizer/BioNTech.

În cazul vaccinurilor Pfizer/BioNTech pentru administrarea dozei de rapel trebuie administrată aceeași doză, ca pentru vaccinarea de bază. În cazul vaccinului Moderna doza de rapel se realizează cu jumătate din doză.

Unde pot solicita vaccinarea?

Administrarea vaccinurilor constituie responsabilitatea cantoanelor. Pentru mai multe informații accesați pagina web/folosiți linia telefonică pentru informații a cantonului dvs. (www.foph-coronavirus.ch/cantons), unde aveți posibilitatea de a vă înregistra și de a solicita vaccinarea. Sau adresați-vă medicului sau farmacistului dvs.

Restul informațiilor privind doza de rapel sunt identice cu informațiile privind imunizarea de bază și pot fi consultate pe fișa „Informații generale privind vaccinarea anti-Covid 19 cu un vaccin ARNm”.

¹ Tabelul 2, pagina 11 privind recomandarea vaccinelor ARNm:
Definiții ale bolilor în cazul persoanelor cu boli cronice și expuse la risc maxim (în limba română)