



Dopunska vakcinacija sa mRNA vakcinom (Pfizer/BioNTech, Moderna)

Od teškog toka bolesti Covid-19 i boravka u bolnici veoma dobro ste zaštićeni mRNA vakcinom. Kod osoba starijih od 65 godina, međutim, pokazalo se da se ova zaštita vakcinom vremenom može smanjiti. Za ove osobe preporučujemo dopunsko vakcinisanje nakon 4meseca nakon poslednje vakcinacije. Do sada još nije razjašnjeno da li vakcina štiti od težih oboljenja kod osoba mlađih od 65 godina i da li opada za nove varijante virusa. Zaštita od blage bolesti i od prenošenja virusa, međutim, vremenom se smanjuje kod svih osoba. U zavisnosti od varijante, ovo može da se odvija brže ili sporije. Stoga preporučujemo dopunsku vakcinaciju za sve osobe od 16 do 64 godine starosti.

Čemu služi dopunska vakcinacija?

Sa dopunskom vakcinacijom imuni sistem se podseća na patogen. Povećana zaštita vakcinacijom se obnavlja i produžuje.

Kome se preporučuje dopunska vakcinacija?

Dopunska vakcinacija se preporučuje za najbolju moguću zaštitu od teškog toka bolesti Covid-19 uz hospitalizaciju svim osobama preko 65 godina. Posebno za:

- osobe preko 75 godina;
- osobe preko 65 godina sa hroničnim bolestima sa najvećim rizikom¹ od teškog toka bolesti Covid-19;
- stanovnike i negovatelje u staračkim domovima, domovima za starije i bolesne osobe i ustanovama sa dnevnom negom starijih osoba.

Dopunska vakcinacija može pomoći da se poveća zaštita od infekcija i blažih tokova bolesti i njihovih posledica (npr. dugoročnih posledica Covid-19, odsustva sa posla) i da se privremeno smanji cirkulacija virusa za osobe mlađe od 65 godina. Zbog toga se dopunska vakcinacija preporučuje i svima od 16 do 64 godine starosti. Posebno za:

- posebno ugrožene osobe preko 65 godina sa hroničnim bolestima sa najvećim rizikom¹ od teškog toka bolesti Covid-19.
- stanovnike i negovatelje u staračkim domovima, domovima za starije i bolesne osobe i ustanovama sa dnevnom negom starijih osoba.
- Zdravstveni radnici sa direktnim kontaktom sa pacijentima i osoblje koje se brine o osobama koje su posebno ugrožene.

Dopunska vakcinacija se preporučuje i trudnicama od 2. trimestra trudnoće i dojljama.

Kada treba vršiti dopunsko vakcinisanje?

Dopunska vakcinacija se može vršiti 4mesecan nakon kompletne osnovne imunizacijem RNA vakcinom. Potpuna osnovna imunizacija postoji nakon

- dve doze mRNA vakcine; ili
- potvrđene infekcije korona virusom + jedna doza mRNA vakcine u intervalu od najmanje 4 nedelje (bez obzira na redosled).

¹Tabela 2, str. 11 preporuka mRNA-vakcina:

Definicije bolesti za osobe sa hroničnim bolestima sa najvećim rizikom (na nemačkom)

Ako je infekcija korona virusom potvrđena nakon pune osnovne imunizacije sa mRNA vakcinom, u tom slučaju važi sledeće:

- Kod infekcije u roku od 4 meseca od osnovne imunizacije, preporučuje se dopunska vakcinacija 4meseca nakon ove infekcije.
- Kod infekcija nakon više od 4meseca nakon osnovne imunizacije, po pravilu trenutno nije potrebna dopunska vakcinacija.

Koja vakcina i u kojoj dozi se koristi za dopunsku vakcinaciju?

U principu, za dopunsku vakcinaciju treba koristiti istu vakcinu kao i za osnovnu imunizaciju. Ako ta nije dostupna, može se koristiti i druga mRNA vakcina. Ako su za osnovnu imunizaciju korišćene različite mRNA vakcine, dopunska vakcinacija se može izvršiti jednom od te dve vakcine.

Kao i kod osnovne imunizacije, preporučuje se da osobe mlađe od 30 godina za dopunsku vakcinaciju po mogućnosti dobiju vakcinu kompanije Pfizer/BioNTech.

Vakcina od Pfizer/BioNTech se jednako dozira za dodatnu vakcinaciju kao i za osnovnu imunizaciju. Kod vakcine Moderna za dopunsko vakcinisanje se daje polovina doze.

Gde i kada se mogu vakcinisati?

Za vakcinisanje su odgovorni kantoni. Informišite se na internet stranici ili na informativnoj liniji u svom kantonu (www.foph-coronavirus.ch/cantons), gde možete da se prijavite i vakcinišete. Ili pitajte svog lekara ili farmaceuta.

Ostale informacije za dopunsku vakcinaciju su iste kao i za osnovno imuniziranje i možete ih pročitati na letku «Opšte informacije o vakcini protiv COVIDA-19 mRNA vakcinom».

